

Création d'un essaim artificiel




On forme un essaim artificiel soit

- pour affaiblir une(des) colonie(s) (prévention d'un essaimage),
- pour diviser une ruche (Extension du rucher)

Attention le nombre de cadre de couvains à prélever va dépendre du mois de création de l'essaim.
 En avril 2 cadres de couvain, en mai/ début juin 3 cadres de couvain, Fin juin / fin juillet 4 cadres de couvain.

Mettre au frais et dans l'obscurité la ruchette pendant au moins 3 jours. Les butineuses doivent perdre l'emplacement de la ruche donneuse.

Toujours mettre en place la ruchette le soir. Attendre au moins ¼ heure avant d'ouvrir.





1 – Prévention essaimage – Avant juillet

A partir d'une ou plusieurs ruches fortes ou en pré-essaimages, prendre un cadre de miel/pollen et un cadre de couvain ouvert et un ou plusieurs cadres de couvains fermés **avec les abeilles mais SANS la reine.**

Attention vous allez affaiblir les ruches donneuses

Nourrir la ruchette au sirop 50/50 et placer au moins trois jours à la cave. (Froid+obscurité)

Dans les ruches donneuses mettre une partition et un cadre à bâtir.




2 – Division – Augmenter le nombre de ruches – En juillet

Cette méthode permet d'augmenter le nombre de vos ruches en divisant une ruche forte..

La reine ne reste pas dans la ruche donneuse. Les butineuses retourneront dans la ruche donneuse.

Nourrir impérativement au sirop 50/50 les deux colonies



N'oubliez pas de nourrir l'essaim au sirop 50/50 surtout en été.